




Nasjonale kvalitetsindikatorer




Sørlandet ligger høyt i forekomst av kreft

All kreft (ICD-10: C00-96), kvinner, 2014-2023



All kreft (ICD-10: C00-96), menn, 2014-2023






Hos kvinner drives dette av lunge- og hudkreft

Melanom i hud (ICD-10: C43), kvinner, 2014-2023


Hud ekskl. melanom (ICD-10: C44), kvinner, 2014-2023

Andre rettsorganer (ICD-10: C30-34, C38), kvinner, 2014-2023



Pakkeforløp for 24 organspesifikke kreftformer


Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Mål: 70 %

Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid


Definisjon: Andel gjennomførte diagnostiske pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid.



Mål: 70 %

Pasienter diagnostisert med melanom i tidlig stadium (stadium T1)

Definisjon: Andel av pasienter som er diagnostisert med melanom i stadium T1.




Målsetting:
≥ 60 %

Periode:
2023

Kilde:
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

5 års relativ overlevelse etter lungekreft

Definisjon: Relativ overlevelse for lungekreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).




Kilde:
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Målsetting:
25 prosent

Kurativ behandling av lungekreft


Definisjon: Andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen.



Målsetting:
35 prosent

5 års relativ overlevelse etter kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne hos kvinner

Definisjon: Relativ overlevelse for kvinner med kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning (prosent).



Periode:
2023


Kilde:
Kreftregisteret, Folkehelseinstituttet

Målsetting:
≥ 50 prosent

Status brystkreft




Figur 1.2: Kvalitetsmål fordelt på sykehus i 2023.




Figur 2.50: 5 og 10 års relativ overlevelse etter brystkreft for kvinner < 90 år ved diagnose, fordelt på bostedsområde, 2019-2023.

Status prostatakreft




Figur 2.45: Estimert relativ overlevelse 5 år etter diagnose, høyrisiko lokalavansert, nasjonalt og opptaksområde (bosted).



Figur 2.46: Estimert relativ overlevelse 10 år etter diagnose, høyrisiko lokalavansert, nasjonalt og opptaksområde (bosted).

5 års relativ overlevelse etter tykktarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for tykktarmskreftpasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnsammensetning (prosent).



5 års relativ overlevelse etter endetarmskreft

Definisjon: Relativ overlevelse for endetarmskreftspasienter sammenliknet med forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning (prosent).



Målsetting:
68 prosent

Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager

Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager




Periode:
1. tertial 2024

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR),
Folkehelseinstituttet

Korridorpasienter

Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, dagligstue m.m.




Periode:
1. tertial 2024

Kilde:
Særrapportering til Helsedirektoratet,
Norsk pasientregister (NPR), FHI


Utsettelse av planlagte operasjoner

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet




Hoftebrudd operert innen 24 timer

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp



Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått etter innsetting av totalprotese (hofte)




Periode:
2023

Kilde:
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Definisjon: Andel pasienter med infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)




Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS),
Folkehelseinstituttet

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.



Periode:


1. tertial 2024

Kilde:

Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av tredje generasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn i perioden.




Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Periode:
1. tertial 2024

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av kombinasjoner av penicilliner og betalaktamasehemmere per 100 liggedøgn i perioden.




Periode:
1. tertial 2024

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,
Norsk pasientregister (NPR), FHI

Dialysepasienter som får hjemmedialyse

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.



Periode:
1. tertial 2024

Kilde:
Norsk nyregister

MS – start av behandling innen anbefalt tid etter diagnose

Definisjon: Andel nydiagnostiserte pasienter med attakkpreget multipel sklerose som har startet med sykdomsmodulerende behandling innen 3 uker (21 dager) etter diagnose.

