

		Medisinsk serviceklinikk		Generelt dokument	
Sædanalyse - Informasjon til pasienter og rekvisiter - MedBio SSHF				Side 1 av 1	
Dokumentplassering: II.MSK.FEL.LAB FEL.MBIO FEL..2.10-3		Godkjent dato: 19.11.2019	Gyldig til: 19.11.2021	Dato endret: 20.11.2019	Revisjon: 4.00

Medisinsk serviceklinikk\Fellesdokumenter MSK\Laboratoriene fellesdokumenter\Medisinsk biokjemi fellesdokumenter\2 Pasienter og brukere
 DISTRIBUTUSJONSliste: EK + Lab.håndbok, sædbenk (SSK). SSA: Resepsjonsluka, Patologi lab (sædbenk).

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Rekvisiter som ikke har elektronisk overføring får svar per post. Endret prosedyre ift spesialavtale.

Sædanalyse utføres som oftest i forbindelse med infertilitetsutredning (barnløshet), refertilisering og etter sterilisering. Retningslinjen forklarer rutinene ved Sørlandet sykehus.

(Til rekvisiter: Retningslinjen og skjemaer finnes i Laboratoriehåndboka til Sørlandet sykehus.)

Timebestilling:

Sørlandet sykehus, Arendal:

Tlf.: 37014294/ 37014235.

Prøver tas imot tirsdag og torsdag kl. 08–11. Ring samme dag før kl.10 for å få bekreftet at prøven kan leveres.

Sørlandet sykehus, Kristiansand:

Tlf.: 38006867/ 38073465 (hverdager kl. 09-15).

Time bestilles på forhånd. Prøver tas imot tirsdag og onsdag kl. 08.30 - 09.00.

Rekvisisjon

Pasienten bør ha med rekvisisjon fra lege når prøven leveres.

Skjema til sædanalyse:

Pasienten må ha med ferdig utfylt skjema når prøven leveres. Vi har to typer skjema: «Skjema til sædanalyse ved infertilitetsutredning» og «Skjema til sædkontroll etter sterilisering». Skjema fås enten av legen eller ved henvendelse til laboratoriet.

Prøvetaking:

Prøven tas mellom 2. og 7. døgn siden forrige samleie/ sædavgang. Prøven tas ved masturbasjon. Kondom dreper sædcellene og kan ikke brukes. Avbrutt samleie må heller ikke brukes som metode. Hånd og penis vaskes før prøvetaking (brukes såpe, må det skylles godt med vann). Sæden samles direkte i et spesialbeger beregnet for dette. Beger fås av legen eller ved henvendelse til aktuelt laboratorium. Hele sædmengden skal med i begeret. Hvis ikke, merkes det av på skjemaet som «Ikke fullstendig prøve».

For de fleste er det greit å ta prøven hjemme.

Fra prøven tas til den er levert på laboratoriet, må det ikke gå mer enn 1 time.

For de som har lang vei, kan prøven tas på laboratoriet.

Levering av prøven:

Prøven må holdes varm under transporten til sykehuset. Oppbevar den gjerne i en innerlomme. Prøven bringes så hurtig som mulig til sykehuset (innen 1 time etter prøvetaking). Pasienten henvender seg i ekspedisjonen til aktuell avdeling.

Sørlandet sykehus, Arendal: Laboratorieavdelingen, 3. etasje.

Sørlandet sykehus, Kristiansand: Avdeling for medisinsk biokjemi, 2. etasje.

Resultat:

Resultatet sendes elektronisk til rekvisiterende lege. Rekvisiterer som ikke har elektronisk overføring får svar per post. Det er rekvisiterende lege som formidler resultatet av prøven til pasienten.

DokumentID:D35535

Utarbeidet av: Bente U. Vinje og Deborah L. Clark	Fagansvarlig: Fagbioing. Deborah L. Clark og Bente K. Omdal	Godkjent av: Klinikkdirektør Siri Tønnessen	Verifisert av: 19.11.2019 - Kvalitetskoordinator Ingunn Gåsvær
---	---	---	--